

瓜蒌子电子交易规格标准

序号	品名	规格名称	流通过称	白子重量占比	异形子重量占比	虫蛀、霉变	干度
1	瓜蒌子	双边瓜蒌子选货	双边选	≤2%	≤1%	无	干货
2	瓜蒌子	双边瓜蒌子统货	双边统	≤8% ≤5% ≤3%	≤10% ≤5%	无	干货
3	瓜蒌子	单边瓜蒌子选货	单边选	≤2%	—	无	干货
4	瓜蒌子	单边瓜蒌子统货	单边统	≤8% ≤5% ≤3%	—	无	干货

瓜蒌子电子交易规格标准

1 基础数据

1.1 来源(《中国药典》 2015 版): 本品为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的干燥成熟种子。栽培 1 年。秋季采摘成熟果实, 剖开, 取出种子, 洗净, 晒干。四川和河北地区为双边栝楼, 安徽为栝楼。

1.2 产地: 产于河北、四川、安徽、山西、山东、江苏、河南和湖北等地, 主产于河北安国、四川简阳、安徽亳州。

1.3 栝楼: 呈扁平椭圆形, 长 1.2~1.5cm, 宽 0.6~1.0cm, 厚约 0.4cm。表面浅棕色至棕褐色, 平滑, 沿边缘有 1 圈沟纹。顶端较尖, 有种脐, 基部钝圆或较狭。种皮坚硬; 内种皮膜质, 灰绿色, 子叶 2, 黄白色, 富油性。气微, 味淡。

1.4 双边栝楼: 较大而扁, 长 1.5~1.9cm, 宽 0.8~1.0cm, 厚约 0.3mm。表面棕褐色, 沟纹明显而环边较宽。顶端平截。

2 规格要素说明及名词解释

2.1 形态: 双边瓜蒌子较大而扁, 边缘有较明显沟纹; 单边瓜蒌子呈扁平椭圆形, 边缘无明显沟纹。

2.2 白子: 未成熟种子, 表皮灰白色, 轻泡。

2.3 异形子: 双边栝楼变异种子, 扁平, 类长条形、方形。

3 规格等级定义

3.1 双边瓜蒌子选货: 双边, 手工选出白籽和异形籽, 白子重量占比不超过 2%, 异形子重量占比不超过 1%。

3.2 双边瓜蒌子统货: 双边, 白子重量占比不超过 8%, 异形子重量占比不超过 10%。

3.3 单边瓜蒌子选货: 单边, 手工选出白籽和异形籽, 白子重量占比不超过 2%。

3.4 单边瓜蒌子统货: 单边, 白子重量占比不超过 8%。