

### 骨碎补电子交易规格标准

序号	品名	规格名称	流通过称	外皮颜色	质地	形态	0.2cm 以下碎末、鳞毛和泥沙重量占比	虫蛀、霉变	干度
1	骨碎补	骨碎补统个	骨碎补	深棕色	质软、体轻	长扁条状，体表多鳞毛	≤10%≤5%	无	干货
2	骨碎补	褐色硬骨碎补统片	骨碎补	褐色	质硬、体重	不规则斜片，体表无鳞毛，	≤3%	无	干货
3	骨碎补	棕色硬骨碎补统片	骨碎补	红棕色	质硬、体重	不规则斜片，体表无鳞毛，	≤3%	无	干货

## 骨碎补电子交易规格标准

### 1 基础数据

1.1 来源(《中国药典》 2015 版): 骨碎补为水龙骨科植物槲蕨 *Drynaria fortunei*(Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。野生。全年均可采挖, 除去泥沙, 干燥, 或再燎去鳞片。市场流通的另有两种商品, 习称“硬骨碎补”: 棕色硬骨碎补(《广西省中药材标准》 1990 版): 来源于水龙骨科植物大叶骨碎补 *Davallia formosana* Hayata; 褐色硬骨碎补(《藏药标准》 1979 版): 来源于水龙骨科植物中华槲蕨 *Drynaria baronii* (Christ. ) Diels。

1.2 产地: 产于四川、云南、湖北、湖南、重庆、贵州、广东、广西等省。

1.2.1 骨碎补: 主产于四川、云南、湖北。

1.2.2 褐色硬骨碎补: 主产于湖北、重庆。

1.2.3 棕色硬骨碎补: 主产于广西、云南。

1.3 骨碎补

1.3.1 加工: 手撕为条状。或用沙烫去鳞片。

1.3.2 性状: 本品呈扁平长条状, 多弯曲, 长 5~15cm, 宽 1~1.5cm, 厚 0.2~0.5cm。表面密被深棕色至暗棕色的小鳞片, 或因加工去掉具少许鳞片。体轻柔软, 质脆, 易折断, 断面红棕色, 气微, 味淡、微涩。

1.4 褐色硬骨碎补片

1.4.1 加工: 除去泥沙, 干燥, 切片。

1.4.2 性状: 本品呈短条状, 长 1.0~4.0cm, 宽 0.2~1.4cm, 厚 0.1~0.3cm。表面附小鳞片, 易脱落, 脱落后呈棕褐色, 质较硬。

1.5 棕色硬骨碎补片: 本品呈不规格短条形片, 长 1.0~3.0cm, 宽 0.4~0.8cm, 厚 0.3cm 左右。略扁, 表面红棕色, 有皱纹和突起的圆形叶痕及少量黄棕色鳞片, 气微弱, 味微涩。

### 2 规格要素说明及名词解释

2.1 质地: 正品骨碎补多质软、体轻。流通的商品硬骨碎补多质硬、体重。

2.2 形态: 骨碎补为长扁条状, 体表多鳞毛。骨碎补片为不规则斜片, 体表无鳞毛。

2.3 外皮颜色: 正品颜色多为深棕色, 流通的商品硬骨碎补为褐色或红棕色。

2.4 0.2cm 以下碎末、鳞毛和泥沙: 用直径 0.2cm 标准筛可筛除掉落的碎末、鳞毛和残留的泥沙。

2.5 虫蛀、霉变: 骨碎补易虫蛀、霉变, 应妥善贮存, 及时养护。

### 3 规格等级定义

3.1 骨碎补统个: 长扁条状或撕条状, 大小不分, 深棕色, 体表多鳞毛, 质

软，体轻，0.2cm 以下碎末、鳞毛和泥沙不超过 10%。

3.2 褐色硬骨碎补统片：不规则斜片，大小不分，褐色，体表无鳞毛，质硬、体重。0.2cm 以下碎末、鳞毛和泥沙不超过 3%。

3.3 棕色硬骨碎补统片：不规则斜片，大小不分，红棕色，体表无鳞毛，质硬、体重。0.2cm 以下碎末、鳞毛和泥沙不超过 3%。

WWW.ZYCTD.COM